

REPORTE DE PATOLOGIA QUIRURGICA

Paciente: 32466 - 43 **BOLAÑOS OCAÑAS JUAN JOSE.**

Folio: **14-1612**

F. Nacimiento: 30/09/52 Edad: 61 a Sexo: M Solicita: QUIROFANO

Institución:

Fecha Solicitud: 14/05/14 14:01

Médico Solicitante: PRADA BARRIOS VICTOR HUGO

Fecha Reporte: 19/05/14 14:26

Especimen Recibido:

Riñon izquierdo.

Diagnóstico Final:

Producto de nefrectomía radical izquierda:

- Lecho quirúrgico renal con necrosis, fibrosis y proceso inflamatorio crónico con reacción granulomatosa de tipo cuerpo extraño.
- Adenoma papilar de 0.4 cm. de diámetro subcortical.
- Bordes quirúrgicos libres de neoplasia.
- Suprarrenal con congestión vascular.

Descripción Macroscópica:

Se recibe en formol producto de nefrectomía izquierda encontrándose riñón que mide 13 x 6 x 5 cm. cubierto por abundante tejido fibroadiposo, en la región del hilio se observa arteria y ureteros tubulares café rojizos, blandos que miden 4 x 0.4 cm. cada uno, en el mismo frasco se reciben múltiples fragmentos de tejido fibroadiposo, irregulares, lobulados y blandos que miden en conjunto 10 x 8 x 2 cm. entre ellos se distingue glándula suprarrenal amarillenta, friable de 5 x 2 x 1 cm. a la sección de la pieza se observa en el polo inferior una zona de 4 x 2.5 cm. irregular, mal definida con coloración rojo amarillenta, se distinguen hilos de sutura en esta región; además se observa una lesión amarillenta bien circunscrita de 0.4 cm. en la región media del riñón por debajo de la capsula, el resto del parénquima de características macroscópicas normales.

Se incluyen cortes representativos en capsulas: A) Hilio, D-G) Muestreo de lecho quirúrgico, H) Muestreo de parénquima renal, I) Glándula suprarrenal.

Comentario:

Los cortes realizados al lecho quirúrgico muestran extensas zonas de necrosis, fibrosis, proceso inflamatorio mixto con abundantes linfocitos, células plasmáticas y células gigantes de tipo cuerpo extraño secundarios a hilos de sutura, no se observa células malignas viables en el lecho quirúrgico.

El resto del parénquima muestra degeneración hidropica renal, congestión, discreto edema y una lesión benigna compuesta por proliferación de estructuras tubulo-papilares de características benignas correspondiente a adenoma papilar. Los bordes quirúrgicos a nivel del hilio y de la capsula renal no muestran células neoplásicas residuales. La glándula suprarrenal muestra discreto edema y congestión vascular.

Atentamente

BOLAÑOS OCAÑAS JUAN JOSE.

Página 1 de 1

FR-PAT-008/Rev.05/20-MAY-2014